INDOTESTUDO ELONGATA

Famille des Testudinidés - Nom Commun : Tortue à Tête Jaune

GEOGRAPHIE :

Cette espèce se situe entre le BENGLADESH le CAMBODGE la CHINE les provinces de GUANGXI L'INDE L'AOS MALAISIE NEPAL THAILANDE et VIETNAM.

DESCRIPTION : Il existe trois types de tortue à « TETE JAUNE » : une allongée, une ovale et l'autre plutôt basse et parfois plate.

Adulte cette tortue mesure environ 29 cm pour la femelle 33 cm pour le mâle. Elle vie 50 ans environ.

Cette Indotestudo pèse environ 3 kg à 3,8kg. Plutôt timide et discrète, elle est très agréable en captivité. D'une couleur jaunâtre et marron, les taches noires sur sa carapace varient selon les individus. La queue du mâle est plus longue, très épaisse. Son plastron est plus concave que celui de la femelle.

Cette tortue à une très grande particularité : saliver pour humidifier sa tète, son cou et ses pattes, procurant ainsi un effet de rafraichissement par évaporation.

HABITAT NATUREL : On la retrouve dans des habitats chauds et humides avec 60 à 80% d'humidité, néanmoins elle peut vivre dans des habitats rocheux, caillouteux et secs. Elle accepte les chaleurs les plus extrêmes jusqu'à 48°C. Pendant la saison sèche, elle peut rester immobile sous un taillis, ou un amas de feuilles en semi-estivation, cela pendant plusieurs jours.

HABITAT EN CAPTIVITE : habitats chauds et humides des zones marécageuses 2 à 5 cm d'eau, un point chaud et sec 29 à 31° ainsi que des UVB 10 à 12 heures l'été, 8 à 10 heures l'hiver. Une zone sableuse légèrement humide pour un endroit tranquille de ponte. Dans un coin un point d'eau toujours propre et à disposition.

ALIMENTATION EN MILIEU NATUREL : En milieu naturel elle est frugivore et herbivore. Elle aime les limaces, les carcasses d'animaux, les champignons, et les matières organiques dans l'humus. Elle apprécie surtout les fruits.

ALIMENTATION EN CAPTIVITE : Même régime alimentaire (trèfle, mâche, pissenlit, endive, pomme, poire, limaces, escargots, crevettes etc.…). Quelques fruits quelles appréciera. Un os de seiche pour ses besoins en calcium

L'ACCOUPLEMENT ET LA PONTE :
On considère que cette tortue arrive à maturité sexuelle entre 11 et 13 ans
Attention le mâle peut être agressif celui-ci vocalise bruyamment pendant l'accouplement, la couleur de sa tète se modifie pendant cette période devient jaune vif à rose autour des yeux et du nez. Plus tard la femelle devient agitée choisi un endroit très humide et exempt de végétation. Elle creuse un nid de 15 à 20 cm de profondeur avec ses pattes arrière et si le sol est trop dur et sec elle l'humidifie en vidant sa vessie. Elle dépose enfin de 4 à 5 œufs de juillet à octobre avec une fréquence de 2 à 3 nids par saison qu'elle recouvrira avec ses

pattes arrière. Les œufs pèsent environ 42 à 46 gr, et mesures environs 40mn à50mn. Le temps d'incubation est de 100 jusqu'à 190 jours à 28,5°C /29°C. Les jeunes naissent et pèsent entre 30 à 35 gr.

EXPERIENCE PERSONNELLE : Je laisse les juvéniles dans l'incubateur plusieurs jours après l'éclosion (voir leurs premières semaines de vie) pour éviter une déshydratation trop rapide.

MENACE : Cette tortue se trouve malheureusement dans les marchés alimentaires d'ASIE. L'espèce a été placée à l'Annexe II qui réglemente le commerce international légal. INDRANEIL DAS propose que son statut soit étudié rapidement.et que le commerce international qui pèse sur elle soit mieux contrôlé

ATTENTION cette tortue n'hiberne pas.